

# ATENȚIE!

Pentru medicii care au în tratament pacienți cu Miastenia gravis

## Medicamente interzise în Miastenia gravis

*A) D-penicilamina nu trebuie utilizată*

*NICIODATĂ la pacienți cu miastenie*

*B) Urmatoarele medicamente produc agravarea miasteniei la majoritatea pacienților și trebuie evitate sau utilizate cu prudență și pacientul să fie atent monitorizat:*

*1) succinilcolina, d-tubocurarina, vercuronium*

*și alți agenți blocați neuromusculari*

*2) chinina, chinidina și procainamida*

*3) unele antibiotice, în special: tobramicina, gentamicina, kanamicina, neomicina, streptomicina, colistin, eritromicina, ciprofloxacina, telitromicina*

*4) betablocantele: propranolol, timolol maleat picături pentru ochi*

*5) blocantele canalelor de calciu*

*6) substanțele de contrast iodate*

*7) magneziul și preparatele ce conțin magneziu*

## Lista cu medicamentele ce pot agrava Miastenia Gravis

### I. Medicamente care pot exacerba miastenia sau evidenția o miastenie latentă

- Blocante neuromusculare: (curarizante, ex Vercuronium®)
- Excesul de anticolinestrazice: pyridostigmina (Mestinon®) sau neostigmina (Miostin®)
- Corticosteroizii și ACTH (Prednison, uneori la începutul tratamentului)
- Magneziu și preparatele ce conțin magneziu
- Antiaritmice:
  - Lidocaina (Xilina) administrată intravenos (local se poate administra fără riscuri)
  - Chinidina și preparatele pe baza de chinina
  - Procainamida (Pronestyl®)
- Fenitona și medicamentele înrudite (ex. Dilantin®)
- Antibiotice
  - aminoglicozide (gentamicina, tobramicina, amikacina, neomicina, streptomicina, kanamicina)
  - polipeptide: polimixina, colimicina (Colistin)
  - miscelane (alte antibiotice) clindamicina, ciprofloxacina, eritromicina, telitromicina (KETEK®)

### II. Medicamente ce pot induce miastenia prin provocarea unei reacții autoimune

D-penicilamina (Cuprimine®)  
Trimetadiona (Tridione®)

### III. Medicamente implicate în agravarea miasteniei în cazuri izolate

Cimetidina (Tagamet®)  
Anestezice (inclusiv alcoolul)  
Chloroquina  
Cocaina  
Diazepam (Valium®)  
Lithium  
Propranolol  
Timolol maleat (Timoptic®) - picături pentru ochi  
Tetraciclinele:

- tetraciclina,
- chlortetraciclina,
- oxytetraciclina,
- demeclocyclina,
- doxyciclina (Vibramycin®),
- minocyclina

Trihexyphenidyl (Artane®)

**Important pentru pacienți:**

**Evitati automedicatia!**

**Consultati specialistul neurolog.**

Agravarea slăbiciunii la pacienții miastenici a fost raportată și la alte medicamente. Toți pacienții cu Miastenia gravis trebuie urmăriți ori de câte ori se instituie o nouă medicație.

***Asociația Națională  
Miastenia Gravis România***

Este o organizație non-profit, umanitară, ce are drept scop apărarea drepturilor și intereselor persoanelor afectate de Miastenia Gravis și îmbunătățirea calității vieții acestora.

Ne propunem să realizăm aceste deziderate prin programe educaționale, de reabilitare și recuperare, de informare și mediatizare a problematicii specifice bolnavilor miastenici, de pregătire a profesioniștilor și de stimulare a cercetării medicale în domeniu

***Asociația Națională  
Miastenia Gravis România***

Str. G-ral. George Macarovici nr. 7, sector 6,  
cod 060142, București, România

Tel: 0744 70 43 99; 031.4013830

Fax: 021.7603023

Email: asociatia.miastenia@gmail.com

**[www.miastenie.ro](http://www.miastenie.ro)**

Parteneri ai Euromyasthenia  
[www.euromyasthenia.org](http://www.euromyasthenia.org)

CIF: 18136030;  
Nr. înreg. Registru special: 70/08.11.2005  
IBAN: RO55BPOS71906938789RON01,  
BancPost Bucuresti - Agentia Lizeanu



**Lista  
medicamentelor  
care pot agrava  
Miastenia Gravis**

Sursa materialului

Myasthenia Gravis Foundation of America MGFA  
[http://www.myasthenia.org/hp\\_edmaterials.cfm](http://www.myasthenia.org/hp_edmaterials.cfm)  
Healthcare Professionals: Educational Materials  
Clinical News/alert: Myasthenia Gravis, 2008

**Material informativ cu scop educațional**